

# Fixormon

## Ormone liquido polivalente



**Modalità d'azione e vantaggi agronomici:** FIXORMON è un fitoregolatore di sintesi ad azione polivalente. Evita la cascola precoce dei frutti nel periodo di pre raccolta, perché una volta distribuito sulla pianta penetra nell'interno di questa e per un periodo di 15-20 giorni è in grado di interferire sulla suberificazione del picciolo e sulla caduta precoce dei frutti. FIXORMON controlla l'emissione dei germogli laterali, dei polloni radicali ed esplica azione diradante.

### Dosi e modalità d'impiego

**AZIONE ANTICASCOLA (Melo, pero, pesco):** diluire 15-30 ml per 100 litri d'acqua irrorando uniformemente tutta la pianta. Sulle varietà estive ed autunnali eseguire il trattamento 3-4 settimane prima della raccolta. Si consiglia di impiegarlo nelle ore più fresche della giornata e su piante sane.

**CONTROLLO DELL'EMISSIONE DEI GERMOGLI LATERALI (Melo, pero, pesco):** eseguire 3-4 trattamenti, partendo da fine maggio ad intervalli di 8-10 giorni, alla dose di 10-15 ml ogni 100 litri di acqua.

**AZIONE SPOLLONANTE (Melo, pero, pesco, vite):** eseguire il trattamento con i polloni alti 10-30 cm, alla dose di 1 litro di Fixormon ogni 10 litri di acqua, avendo cura di bagnare bene foglie ed apici dei getti.

**AZIONE DIRADANTE (Melo, pero, pesco):** eseguire il trattamento quando i frutticini hanno raggiunto la dimensione di 10-15 mm, alla dose di 12-20 ml ogni 100 litri di acqua.

### Composizione:

NAA puro g 8 (= 85 g/l)  
Coformulanti e solventi q.b.a. g 100

**Taglia:** 1 l

**Compatibilità:** Non miscelare il prodotto con altri formulati.

**SOSPENDERE I TRATTAMENTI 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA**

**MANIPOLARE CON PRUDENZA**

Registrazione del Ministero della Sanità n. 5292 del 30/03/1983