

CARATTERISTICHE

REPCAR è un concime fogliare, basato su un complesso di rame chelato con EDTA.

La sua applicazione nutre la pianta e contribuisce a rafforzare i naturali meccanismi interni che aiutano la pianta stessa a superare particolari momenti di stress.

MECCANISMI DI AZIONE ED USI

Il rame è un elemento essenziale per la vita delle piante. È parte di proteine ed enzimi per la fotosintesi. Funge da catalizzatore delle reazioni di ossidazione e riduzione, essendo parte essenziale delle proteine e dei complessi che trasportano gli elettroni.

La mancanza di rame nelle piante provoca stress e rallentamento della crescita, perdita di turgore delle foglie e dei giovani steli, presenza di frutti piccoli e incolori.

CONCIME CE

Soluzione di concime a base di Rame (Cu) EDTA	Rame (Cu) chelato con EDTA	2% p/p
Rame (Cu) solubile in acqua	2% p/p	

Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4-8

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

Confezioni da: 5 litri x 4 - 1 litro x 12

PRIMA DELL'USO LEGGA ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI SU QUESTA ETICHETTA.

AGITARE PRIMA DELL'USO

Manipolare e conservare a temperature comprese tra 3° e 30°C. In caso di dispersione del prodotto, raccogliarlo ed evitare sversamenti nei pozzetti di raccolta.

CONCIME CE

- Applicazione fogliare: 200-250 cc/hl (2/2,5 lt/ha)
- Durata dell'efficacia 2/3 settimane, in caso di dilavamenti da forti piogge o irrigazioni ripetere il trattamento.
- Se applicato al terreno usare 3,5 cc/lt.
- Su fruttiferi applicare sul fusto e non sulla parte aerea.

REPCAR è adatto per tutti i tipi di colture: viti ornamentali, ortaggi, frutta agrumi, ulivi, alberi, ecc.

Dato che REPCAR contiene rame nella sua formulazione, potrebbe essere fitotossico in alcune drupacee.

È consigliabile fare un test su piccola scala. Nella varietà non soggetta a fitotossicità, applicare al tronco e alla base della pianta durante il ciclo vegetativo.

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

Usare su coltura secca e nelle ore serali.

Non mescolare con aminoacidi, o concimi o prodotti fitosanitari che siano incompatibili con il rame.

Applicare a pH tra 6-7. Applicare al tramonto. Applicare con temperature di 12°-26° e umidità relativa superiore all'80%.

AVVERTENZE

Conservare in luogo fresco ed asciutto. Le raccomandazioni e informazioni sono il risultato di ampi e rigorosi studi e sperimentazioni. Tuttavia, nell'uso possono essere coinvolti numerosi fattori che sfuggono al nostro controllo (preparazione della miscela, applicazioni, condizioni climatiche).

L'azienda garantisce la composizione, formulazione e contenuto. L'utente potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato da negligenza o inosservanza totale o parziale delle istruzioni su questa etichetta.

FERTBEN

www.fertben.it

